

DESINFEKTIONSPLAN

Heilpraktiker

Stand: 02/2007

WAS?	WOMIT?	Menge Einwirkzeit	WIE?	WANN?	WER?
 Hygienische Händedesinfektion	Aseptoman	konz. 30 sec. satte Benetzung	Das Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	Vor Arbeitsbeginn; vor invasiven Maßnahmen; nach Kontakt mit kontaminiertem Material; nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen; Bei Bedarf.	Heilpraktiker Medizinisches Personal
 Händewaschung	Desowasch Kamille		Flüssigseife aus Spender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Nach Verschmutzung; nach Toilettenbesuch; vor Pausen, bei Bedarf.	Heilpraktiker Medizinisches Personal
 Haut- und Händepflege	Desolind Soft		Entnahme aus Spenderflaschen. In die Haut einmassieren.	Mehrmals täglich. Bei Bedarf.	Heilpraktiker Medizinisches Personal
 Hautdesinfektion	Aseptoderm talgdrüsenarme Haut talgdrüsenreiche Haut	konz. 15 sec. / konz. 60 sec. konz. 10 min.	Präparat aufsprühen, mit sterilisiertem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).	Vor Blutentnahmen; vor Injektionen; Akupunktur. Vor Bauscheidt-Therapie; vor blutigem Schröpfen.	Heilpraktiker
 Instrumentendesinfektion	Desomedan ID	1,0 % - 60 min. 2,0 % - 30 min. 3,0 % - 15 min.	Manuelle Aufbereitung: Instrumente in geöffnetem Zustand in die Lösung einlegen. Nach Ende der Einwirkzeit die Instrumente der Wanne entnehmen, event. Bürstenreinigung, mit Wasser abspülen und trocknen.	Sofort nach Gebrauch.	Medizinisches Personal
 RR-Gerät Stethoskope Staubband Thermometer	Biguamed Perfekt	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min.	Desinfizierend abwischen.	Nach Gebrauch / Benutzung.	Medizinisches Personal
 Medizinische Geräte	Biguamed Perfekt Desomed Rapid AF	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min. konz. 1 min.	Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen. Herstellerrangaben beachten.	Täglich; nach Gebrauch.	Medizinisches Personal
 Mobiles Inventar - Behandlungsliegen - Infusionsständer Einmal-Auflagen	Biguamed Perfekt Desomed Rapid AF	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min. konz. 1 min.	Desinfizierend abwischen bzw. auswischen (sofern für die Untersuchungsfläche keine Einmal-Papieraufgaben verwendet werden). Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen. Ersetzen.	Einmal täglich; nach Gebrauch, bei Bedarf. Nach Patientenwechsel. Desinfektion am Ende des Arbeitstages.	Medizinisches Personal
 Flächen, Arbeitsflächen	Biguamed Perfekt für kleine und unzugängliche Flächen Desomed Rapid AF	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min. konz. 1 min.	Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben. Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.	Einmal täglich; nach Bedarf.	Medizinisches Personal
 Waschbecken	Biguamed Perfekt	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min.	Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. Perlatoren 1 x monatlich entfernen und in Essigreiniger einlegen.	Einmal täglich. Bei Bedarf.	Reinigungs- personal
 Toiletten	Biguamed Perfekt	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min.	Brille, Deckel u. Armatur - Feucht-Wisch-Methode. Desinfizierende Reinigung des Toilettenbeckens und der Bürstenschale.	1-2 mal täglich. Bei Bedarf.	
 Abfallbehälter	Biguamed Perfekt	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min.	Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen.	In regelmäßigen Abständen. Bei Bedarf.	Reinigungs- personal
 Reinigungsutensilien Aufbereitung	maschinelle Aufbereitung Waschprogramm: >60 °C bzw. 95 °C Haushaltswaschmittel		Mops / Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen.	Nach Benutzung.	Reinigungs- personal
 Fußboden - Behandlungsraum - Aufbereitungsraum	Biguamed Perfekt	0,5 % - 60 min. 1,0 % - 15 min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, z.B. Zwei-Eimer-Wisch-Methode oder Bezugs-Wechsel-Methode. Nicht nachtrocknen.	In regelmäßigen Abständen, mindestens 1 mal täglich. Bei Bedarf.	Reinigungs- personal
 Flächendesinfektion bei meldepflichtigen Infektionen gem. § 18 IfSG	Auf amtsärztliche Anordnung.		Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten, sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes (RKI-Liste) anzuwenden.	Auf amtsärztliche Anordnung.	benannte Person

Merke

- >Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten!
- >Bei Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen!
- >Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
- >Beim Umgang mit Blut, Fäzes und Auswurf sind generell die Hände mit Einmalhandschuhen vor direktem Kontakt zu schützen.

Schutzhandschuhe tragen!

Die Berufsgenossenschaftliche Regel 250 und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden!

